



Frühdefibrillation durch Laienhelfer

Bewusstseinskontrolle

- Lautes Ansprechen
- An Schulter vorsichtig rütteln
- Lage möglichst nicht verändern



Bewusstlos

Rufen um Hilfe

Defibrillator besorgen lassen

Atemkontrolle

- Atemwege freimachen
- Kopf nackenwärts beugen
- Sehen der Atembewegung
- Hören der Atemgeräusche
- Fühlen des Luftstroms an der Wange

Keine normale Atmung

NOTRUF

**Wo ist der Notfallort?
Was ist geschehen?
Wieviele Betroffene?
Welche Verletzungen?
Warten auf Rückfragen**


Herz-Lungen-Wiederbelebung

- Hände in Brustmitte
- Drucktiefe 5 bis 6 cm
- Tempo 100 bis 120/Min.
- 1 Sek. lang Luft in Mund oder Nase einblasen
- 30 x Herzdruckmassage
- 2 x Atemspende
- 5 Zyklen

Falls AED unmittelbar zur Verfügung steht, sofort mit AED beginnen.

Analyse durch AED

Defibrillation (Schock)



Atmung vorhanden, noch bewusstlos

Stabile Seitenlage

- Bewusstseinsüberwachung
- Atmung

Das AED-Gerät kann bereits bei Kindern ab 1 Jahr angewendet werden. Lassen Sie sich die einfache Handhabung des Defibrillationsgerätes von Ihrem Roten Kreuz zeigen. Die AED unterstützt die Wiederbelebung und kann das Herz wieder zum Schlagen bringen.
Damit retten Sie Leben!